

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN  
TECHNIQUE  
DES  
STATIONS  
D'AVERTISSEMENTS  
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

**ÉDITION DE LA STATION DE CHAMPAGNE** (Tél. 47-22-87)  
(AISNE, ARDENNES, AUBE, HAUTE-MARNE, MARNE, MEUSE)

**ABONNEMENT ANNUEL**  
**15 F**

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux, 5, place Paul-Jamot - REIMS.  
C. C. P. : CHALONS-SUR-MARNE 2.802-15

SUPPLEMENT N° 1 au BULLETIN N° 62 de NOVEMBRE 1965

25 novembre 1965

## GRANDE CULTURE

### INFORMATION

#### Grosse altise du colza -

L'attention des exploitants agricoles a été attirée par un avis en date du 7 octobre sur l'importance de la pullulation actuelle de la grosse altise ou altise à tête dorée du colza, pullulation observée dans les régions où la culture de cette plante s'est maintenue au cours des dernières années et qui était telle, lors de la récolte des colzas en juillet-août 1965, que les insectes parfaits pouvaient se trouver en abondance dans les trémies des moissonneuses-batteuses.

Le traitement recommandé par l'avis du 7 octobre, et qui était justifié par la présence de deux insectes par mètre carré de culture en moyenne, n'a pas toujours été effectué car l'importance des populations du parasite est difficile à évaluer en raison de la petite taille des altises; elle est souvent sous estimée.

Présentement, les pontes sont écloses et les jeunes larves ont pénétré dans le pétiole des feuilles qu'elles minent. Les colzas semés tôt ou à exposition chaude sont les plus envahis.

Il y a donc lieu d'examiner les cultures avec soin pour y déceler la présence des larves de la grosse altise; un traitement est à conseiller si plus de 30 % des pieds de colza sont contaminés.

Utiliser de préférence une spécialité à base de lindane en émulsion à la dose de 400 g. de matière active par hectare; mouiller abondamment à raison de 500 à 600 litres de bouillie par hectare et sous forte pression.

L'accès des cultures étant parfois difficile en cette saison par suite de l'état des terres, il est possible d'appliquer le traitement le matin lorsque le sol croûté par une légère gelée permet le passage des pulvérisateurs à grand travail.

Les Contrôleurs chargés des  
Avertissements Agricoles.

l'Inspecteur de la Circonscription  
Phytosanitaire de REIMS.